

# 病虫情报

第十期

莒南县植保站 E-mail:jnzhibao@163.com

2017年7月6日

## 当前花生病虫害防治意见

据县植保站近期田间调查，花生蓟马、蚜虫、红蜘蛛、夜蛾类幼虫（青虫子）及茎腐病等病虫害发生较重。望各镇街搞好田间调查，因地制宜，指导防治，确保花生丰产丰收。

1、花生蓟马。虫田率 90%以上，平均被害墩率 50.9%，高达 100%。

防治方法：可用烯啶吡蚜酮、氯氰毒死蜱、吡虫啉、噻虫嗪等药剂喷雾防治，兼治蚜虫。

2、花生蚜虫。虫田率 30.8%，平均被害墩率 20.5%，高达 80%以上，平均百墩有蚜 768 头，高达 7000 头以上。

防治方法：同花生蓟马。

3、红蜘蛛。虫田率 70%以上，平均单墩有虫 128.9 头，高达 600 头以上。

防治方法：可用哒螨灵、阿维哒螨灵、阿维菌素等药剂喷雾防治。

4、夜蛾类幼虫。虫田率 100%，平均被害墩率 100%，平均百墩有虫 8.3 头，单墩有虫高达 3 头以上。

防治方法：可用甲维盐、高效氯氟氰菊酯、氯虫苯甲酰胺、苏云金杆菌、氯氟双酰胺等药剂喷雾防治。

5、花生茎腐病。病田率 14.3%，平均病墩率 2.2%，高达 15%以上。

防治方法：可用精甲·咯菌腈、噁霉灵、咯菌腈、精甲·咯·啞菌酯等药剂灌墩防治，建议每亩用水量 500 斤以上。

6、近期降雨较多，花生易出现旺长，花生疮痂病、叶斑病将逐渐发生。建议控旺措施不要太重，采取多次轻控方法，有利于花生高产；花生疮痂病、叶斑病防治在 7 月中旬进行，药剂：苯甲·丙环唑、戊唑醇、多菌灵、吡唑醚菌酯、肟菌酯等。

注意事项：

1、要严格按照药剂标签说明进行使用药剂，不要随意加大药剂使用量；使用二次稀释法进行配制药液，充分稀释。

2、使用水量要足，一般要求叶面喷施需水 45 千克（一般 3 喷雾器），灌墩要求 300 千克以上。

3、使用质量好的施药器械，避免跑、冒、滴、漏，使用小孔喷片，保证雾细、雾匀。