



中国卫生  
CHINA HEALTH

# 防冻液不是饮料

## 中毒途径

有些驾驶员为方便常常用饮料瓶分装防冻液，所以急性中毒多为误服。



千万不要用  
饮料瓶分装  
防冻液



## 中毒表现

急性乙二醇中毒多由误服引起，中毒后早期表现为类似酒精中毒的中枢神经系统症状，部分重症病人可昏迷、抽搐；服用量较大者12小时后可出现心、肺等脏器损害，肾脏损害尤为明显，严重者可能因肾功能衰竭或呼吸、循环衰竭死亡。



## 认识防冻液

汽车防冻液是汽车发动机冷却系统用的循环介质，防冻液中乙二醇型最为常见。这类防冻液是无色、无味、微甜的透明水状液体，没有异味。乙二醇水剪性强、挥发性低，易经胃肠道和皮肤吸收，也可经呼吸道吸收。乙二醇及代谢产物均有毒性，主要用于中枢神经系统，对肾脏亦有强大毒性，人口服致死量50ml—150ml。



## 误服 防冻液怎么办

口服者应立即催吐，并送医院治疗。



## 预防

预防防冻液中毒要把好入口关，一定要将防冻液盛放在有标识的容器中，严禁用口吸取防冻液。

