

# 病虫情报

第十一期

莒南县植保站 E-mail:jnzhibao@163.com

2017年7月6日

## 夏玉米主要虫害防治意见

据县植保站近期调查，夏玉米病虫害主要有二点委夜蛾、棉铃虫、粘虫、蓟马等。为了做好虫害的防治，确保夏玉米健康生长，我们提出了以下防治措施。

1、二点委夜蛾。虫田率 3.6%，平均百株有虫 3.6 头，个别地块为害较重，单株有虫高达 2 头。苗期为防治重要时期，可用辛硫磷、敌百虫、氯氰菊酯等药剂灌施于玉米苗周围。

2、蓟马。在玉米心叶内进行为害，可使叶片呈现断续的银白色条斑，并伴随有小污点，受害严重者叶片枯干，还可以引起玉米幼苗“心叶破碎”或扭曲成“牛尾巴状”。据调查，虫田率 4.5%，平均被害株率 15.2%，高达 30%以上。可用烯啶·吡蚜酮、吡虫啉等药剂喷雾防治。

3、棉铃虫、粘虫等。虫田率 13.5%，平均百株有虫 6.7 头，个别地块单株有虫 3 头。可用氯虫苯甲酰胺、氯虫·噻虫嗪、氯虫双酰胺、苏云金杆菌、虫螨腈、高效氯氰菊酯等药

剂喷雾防治。