

病虫害情报

第九期

莒南县植保站 E-mail:jnzhibao@163.com

2017年6月14日

夏玉米播种期病虫害防治意见

为确保夏玉米一播全苗，降低病虫害发生基数，现结合我县夏玉米播种期病虫害发生规律，提出以下防治意见。

1、灰飞虱

灰飞虱是传播玉米粗缩病（俗称小矮子）病毒的主要媒介，做好该虫防治是防止玉米粗缩病的最有效措施。据近期田间调查，我县灰飞虱数量高于去年，有利于玉米粗缩病发生，建议播种期适当延后。

防治方法：播种前，亩用 70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂（锐胜）200 克拌种，兼治蚜虫、地下害虫；玉米苗期，加强灰飞虱防控，可用 10%吡虫啉可湿性粉剂喷雾防治田间、地边、沟渠边杂草上的灰飞虱，减少带毒虫源数量。

2、地下害虫

主要包括地老虎、金针虫、蛴螬等。

防治方法：可用 50%辛硫磷乳油 100 毫升兑水适量，拌

100 公斤玉米种，拌匀后晾干即可播种；也可用 70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂（锐胜）200 克，兑水 1000 毫升，拌种 100 公斤。

3、根茎腐病、苗枯病

对于苗期易发生此类病害的地块，播种前亩用 2.5%咯菌腈悬浮种衣剂（适乐时）40-60 毫升拌种防治。对于地下害虫与玉米病害混合发生的，可采用混配药剂拌种既防病又治虫。

4、杂草

杂草主要马唐、牛筋草、狗尾草、铁苋菜、马齿苋等。

防治方法：玉米播后苗前可亩用 960 克/升精异丙甲草胺乳油（金都尔）100 毫升，或 42%甲·乙·莠 150-200 克/亩，或 80%莠去津可湿性粉剂（玉舒心）100-120 克，兑水 50-60 公斤均匀喷雾。

注意事项：含莠去津的药剂不可过量使用，否则，对后茬小麦等作物有影响。