



中国卫生
CHINA HEALTH

百草枯中毒死亡率居高不下!




中毒表现

早期主要出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状。如剂量较大，可发生急性肺、肝和肾等多脏器损害，严重者可因多脏器功能衰竭而死亡。部分病人在经过多脏器功

能衰竭阶段后，可出现肺间质性病变。严重者可因呼吸衰竭死亡。

百草枯有强腐蚀作用，口服后可造成口腔到胃肠道

黏膜的大面积溃疡。喷洒或配制农药时，若沾到身上，又没有及时清洗，可造成眼、会阴、皮肤等损害。



紧急处理

口服患者，在条件允许情况下尽快催吐，并口服漂白土或活性炭等吸附剂（儿童需谨慎进行上述操作），立即到医院就诊。

不慎洒到皮肤或溅入眼中，立即用清水冲洗。

认识百草枯

百草枯是最常用的除草剂之一，对人毒性极大，且无特效解毒药，口服后中毒死亡率非常高。口服20%百草枯水溶液10ml就可能致人死亡。

百草枯农药大多添加了蓝绿色的着色剂、臭味剂等成分，以防止人误服中毒。



预防一

●在配制和喷洒时要按照规范操作，注意戴手套和面屏，穿长衣长裤，并在操作后立即洗澡更衣。



预防二

●妥善存放，防止误服误用。